Katteracer

Kurilsk bobtail



Red efter pelslængde og giv solide platforme. Træk aldrig i eller ret den korte hale ud; notér ubehag eller ændret bevægelse.

07 · 11 · 2026

Størrelse	**Mellemstor til stor**
Voksenvægt (kg)	**Ikke angivet i den citerede kilde**
Levetid (år)	**15–20 år**
Pels	**Kort eller halvlang, tæt**
Oprindelse	**Rusland**

Raceoplysninger giver baggrund, ikke en individuel ordination. Intervaller er hverken vægtmål eller garanti for levetid.

Justerbart dagseksempel

Raceoplysninger giver baggrund, ikke en individuel ordination. Intervaller er hverken vægtmål eller garanti for levetid.

Eksempel på døgnrytme

Planlagt tid	Opgave / mængde
08:00	Mad og vand
09:00	Leg og berigelse · 5 min
13:00	Mad og vand
18:00	Leg og berigelse · 5 min
20:00	Mad og vand

Eksempel på døgnrytme

Eksempler på holdepunkter: 07:00 tjek af velbefindende og behov, 08:00 mad efter aftalt plan, 13:00 kort aktivitet, 18:00 pleje og 22:00 rolig hvile. Flyt tiderne og hjælp tidligere ved behov. Alle noterer det, der faktisk er gjort.

Sørg for adskilte steder til mad, vand, hvile, skjul og kradsning. Start for eksempel med 5 minutters leg 09:00 og 18:00, kortere hvis katten går. Bakker skal være tilgængelige og renses dagligt; én per kat plus en ekstra er et udgangspunkt.

Mad og vand

Vælg fuldfoder efter art, livsstadie og helbred. 08:00 og 20:00 er kun et eksempel til en voksen med aftalt plan for to måltider; dyr i vækst behøver en anden fordeling. Registrér serveret og spist mængde hver for sig. Beregn ikke gram ud fra racevægt; giv fri adgang til frisk vand.

Medicin og overlevering

Følg kun dyrets ordination: navn, dosis, indgivelsesvej, interval, madbetingelser og datoer. Notér faktisk tid og person og tjek loggen før næste dosis. Kontakt klinikken ved glemt dosis eller reaktion; fordobl ikke dosis.

Søvn og hvile

Giv en rolig, behagelig og tilgængelig seng og uforstyrret hvile dag og nat. Eksempelvinduer er 22:00–07:00 og hvil efter aktivitet; det er hverken indespærring eller garanteret søvn. Toiletbehov, nyfødtes mad og hjælp om natten kommer først.

Nyfødt

Kontrollér effektiv diegivning, sikker varme og individuel vægt dagligt. Forældreløse behøver en dyrlægeplan for artsspecifik mælkeerstatning, også om natten, og oplæring i fodring og hjælp til urin og afføring. Kulde, svaghed eller manglende sutten kræver hurtig hjælp.

Vækst

Giv fuldfoder til killinger i hyppige alderssvarende måltider. Tilbyd sikker leg og hvile, og aftal vaccination, parasitbehandling og kastration med dyrlægen; behovene ændres under væksten.

Voksen

Tilpas måltider, aktivitet, hygiejne og kontroller til huld, tolerance, hjem og vejr. Køn alene bestemmer ikke rytmen; drægtighed, diegivning og kastration kræver individuel gennemgang.

Senior

Gør vand, mad, toilet og seng lette at nå. Notér ændret appetit, vægt, bevægelse og søvn, og aftal kontrolhyppighed med klinikken. Nye symptomer må ikke forklares alene med alder.

Skrøbeligt dyr

Prioritér komfort, smertebehandling, nem adgang til behov og hjælp om natten. Aftal pleje, toilethjælp og vurdering af livskvalitet. Kræv ikke en rask voksens aktivitetsniveau.

Hvornår du skal søge hjælp

Åndedrætsbesvær, kollaps, kramper, stærk smerte eller pres uden urin kræver øjeblikkelig dyrlægehjælp. Kontakt klinikken hurtigt ved ændret appetit, tørst, adfærd eller bevægelse; registrering må ikke forsinke hjælp.

Søvn og hvile

Hvileperioder er muligheder, ikke søvnmål eller indespærringstider. Tillad også hvile ellers; mad, toiletbehov og hjælp, også om natten, går forud.

Justerbart dagseksempel

Planlagt tid	Opgave / mængde
22:45–06:30	Søvn og hvile
09:00–12:00	Søvn og hvile
14:00–17:00	Søvn og hvile
20:30–21:30	Søvn og hvile

Fælles plejelog

Fælles plejelog

Planlagt tid	Opgave / mængde	Udført / person	Noter / næste skridt

Kilder

- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA

Udarbejdet med AI-hjælp og egne AI-illustrationer. Ingen uafhængig dyrlæge- eller modersmålsvurdering. Følg den individuelle dyrlægeplan.